Neue Cerambyciden

aus der Sammlung G. van Roon,

beschrieben von

CHR. AURIVILLIUS.

2.[1])

Mit Taf. 2.

---

14. *Cacia Salomonum* n. sp. — Nigra, infra pube albido-cinerea supra albido signata et pube nigra vestita; fronte genisque albidis, tuberculis antenniferis verticeque nigris; antennis corpore longioribus articulis 3° et 4° apice spinosis, 5—11 elongatis cylindricis quam articulis 3° et 4° simul sumtis longioribus, nigris, articulis 3—5 ad basin albo annulatis; pronoto subquadrato punctato lateribus vix arcuatis vittis 5 albidis, intermediis interruptis macularibus, ornato; scutello nigro vix albo-marginato; elytris apicem versus sensim angustatis supra ad basin vix tumidis haud tuberculatis, ante medium punctatis punctis apicem versus obsoletis, macula communi ante medium, vitta suturali pone medium maculisque 8—9 elongatis albido-tomentosis ornatis; tibiis fuscis annulo medio albo; tarsis supra albis articulo ultimo apice fusco. Long. corporis 11 mm.

Salomonen. — Sammlung van Roon und Reichsmuseum in Stockholm.

Wie bei *Acanthocacia* sind das dritte und vierte Fühlerglied an der Spitze mit einem Dorn bewaffnet; die Dorne sind jedoch viel kleiner als bei *melanops* und *bispinosa* und die Fühlerglieder 5—11 sind schmal und langgestreckt wie bei übrigen *Cacia*-Arten und nicht sehr kurz und dick wie bei *Acanthocacia*. Dazu kommt dass die Augenlappen in einem Punkt zusammenstossen und nicht durch einen

---

[1]) 1. Siehe Tijdschrift voor Entomologie 59, 1916, p. 214—224.

Zwischenraum getrennt sind. Die Art scheint mir darum eine ächte *Cacia* und am nächsten mit *C. vanikorensis* BOISD. verwandt zu sein. Bei dieser Art sind zwar die Fühler nicht bedornt, das dritte Glied hat aber an der Spitze ein kleines Höckerchen.

15. *Prosopocera dahomeica* n. sp. — Nigro-fusca vel fusco-brunnea tomento flavescenti-albido saepe plus minus virescente vestita; capite et prothorace fere impunctatis (punctis tantum perpaucis in fronte prope oculos et postice utrinque in dorso pronoti nec non pone tuberculos laterales praeditis); antennis corpore vix longioribus, brunneis griseo-pubescentibus; scapo sulcum subapicalem pronoti vix superante articulo tertio distincte breviore; pronoto transverso, utrinque tuberculo minuto conico nigro armato, sulco subapicali in medium parum recurvo, sulcis basalibus rectis; scutello late obtuso, dense albido-hirsuto; elytris apicem versus sensim leviter angustatis, apice singulatim rotundatis omnino inermibus, irregulariter maculatim tomentosis et punctatis, punctis prope humeris majoribus margine antico granulato; arcis punctatis pube tenuiore grisea vel virescente vestitis, punctis ipsis nigris; mesosterno producto-tuberculato; lobis inferioribus oculorum genis duplo longioribus. Long. corporis 18—21 mm.

Dahomey. — Sammlung G. VAN ROON und Reichsmuseum in Stockholm. Mit *P. Lameeri* DUVIV. verwandt.

16 *Hestima striolata* n. sp. — Elongata, obscure brunnea; capite, prothorace, sternis, tarsis apiceque tibiarum nigris; subnitida, punctata, pube tenui grisea infra vestita; fronte transversa rude punctata; antennis corpore multo longioribus articulo tertio quam quarto multo breviore, articulis 3° et 4° infra ciliatis; prothorace leviter transverso punctato et supra longitudinaliter striolato; ante apicem leviter constricto; scutello obtuso nigro; elytris apice oblique truncatis inermibus, a basi fere ad apicem rude punctatis, nitidis, subnudis, apice et ad latera leviter pubescentibus, guttis paucis niveis conspersis, margine suturali et laterali anguste nigro; mesosterno profunde triangulariter inciso; medio metasterni abdominеque nitidis impunctatis; pedibus

setis paucis albis instructis; femoribus rufis nitidis. Long. corporis 13.5 mm.

Salomon Inseln.

Erinnert durch Körperform und Färbung an *Orinoeme maculicollis* AURIV.

17. *Pterolophia pulchra* n. sp. — Modice elongata, apicem elytrorum versus angustata, tomento pulcherrime griseo-, brunneo-, fulvo-, albido- et nigro-variegato vestita; capite flavo-griseo linea verticis vittaque lata pone lobis superioribus oculorum nigris; antennis brunneis articulis 4—10 apice anguste pallidis, 3—5 apice breviter spinosis; prothorace griseo, supra flavescente, vittis duabus latis dorsalibus retrorsum divergentibus ornato, apice quam basi latiore, lateribus ante medium magis rotundatis, margine apicali, nigro-maculato, basali setuloso; scutello obtuso medio nigro; elytris pone basin crista brevi nigrosetosa instructis, pone medium sensim fortiter declivibus, apice recte subemarginato-truncatis, costis pone medium valde obsoletis praeditis, ante medium punctatis punctis pone medium tomento fere omnino obtectis, obscure cinnamomeo-brunneis, plaga pone humeros, fascia lata transversa media dentata et extus angustata maculaque magna praeapicali nigris; area suturali pone scutellum fascia lata obliqua ante medium suturam haud attingente vittaque suturali valde irregulari in declivitate albido-cinereis; corpore infra pedibusque griseo- vel flavido pubescentibus, segmento 1° abdominis, macula apicali segmenti 4^{i} segmentoque ultimo fere toto nigrls. Long. corporis 13 mm.

Salomon Inseln. — Sammlung VAN ROON.

18. *Eunidia rufa* n. sp. — Parva, undique punctulata, fere nuda, rufa, apice femorum intermediorum et posticorum nigricantibus; antennis testaceis scapo, articulo 2° apiceque articulorum 5^{i}, 7^{i}, 9^{i} et 11^{i} nigris. Long. corporis 5—6 mm.

Südafrika: Umtali und Salisbury. — Sammlung VAN ROON und Reichsmuseum in Stockholm.

Eine durch die Färbung leicht kenntliche Art. Das kurze dritte Fühlerglied ist wie gewöhnlich an der Spitze mit einem kleinen Dorn bewaffnet.

Amblesthidopsis nov. gen.

Corpus elongatum, sublineare. — Caput haud retractile; vertex longus, declivis — Frons subquadrata; genae mediocres — Oculi emarginati, rude granulati, supra distantes; lobus inferior elongatus, subpyriformis. — Tuberculi antenniferi divergentes, sulco profundo angulari separati. — Antennae corpore modice longiores, scapo excepto infra breviter ciliatae; scapus leviter obovatus, articulus 3^{us} scapo longior, 4^{us} 3^{o} longior, 5^{us} 4^{o} paullo brevior, sequentes sensim breviores. — Prothorax subcylindricus, latitudine paullo longior, utrinque in medio dente parvo armatus, supra sulcis transversis tenuibus in zonas tres partitus, zona intermedia multo latior lineisque irregularibus in areas divisa. — Scutellum apice obtusum. — Elytra elongata, subparallela, ad basin pronoto latiora, apice obtuse rotundata, seriatim punctata, punctis ante apicem evanescentibus. — Acetabula antica postice late clausa, extus leviter angulata; intermedia extus semiaperta. — Prosternum leviter arcuatum, postice valde dilatatum; mesosternum parum declive; metasternum longum. — Femora modice incrassata; postica apicem segmenti ventralis 2^{i} attingentia. — Tibiae sat longae, femoribus vix breviores; intermediae extus distincte sulcatae. — Tarsi antici et intermedii latiusculi; postici angusti. — Unguiculi divergentes.

Die systematische Stellung dieser Gattung ist mir nicht klar. In Grösse und Körperform kommt die einzige bekannte Art die Formen der Gattungen *Belodera* und *Amblestidius* nahe. Durch die nicht ausgesperrten Klauen weicht sie aber von diesen ab und muss darum nach LACORDAIREs System zu den Apomecyniden oder zu den Ptericoptinen gestellt werden. Wie in vielen Fällen ist es nämlich nicht leicht zu sagen, ob die Mittelhüften als geschlossen oder als offen betrachtet werden sollen. Vorläufig scheint es mir am besten die Gattung *Amblesthidopsis* unter den Ptericoptinen in der Nähe von *Mythergates* und *Stenocoptus* zu stellen. Die Zerlegung der Oberseite des Halsschildes in neun durch ganz feine Linien getrennte Felder ist ganz eigenthümlich; von diesen Feldern ist das Mittelfeld sehr lang und schmal, indem es nicht in der Quere geteilt ist.

19. *Amblesthidopsis areolata* n. sp. — Brunnea, griseo-pubescens, vertice vittis duabus antice connatis fusco-brunneis, capite impunctato; pronoto linea media griseo-albida fusco-marginata; scutello griseo; elytris griseo-pubescentibus lituris transversis valde angulatis subnudis brunneis variegatis, a basi ultra medium profunde seriato-punctatis, deinde laevibus; femoribus infuscatis; antennarum articulis 4—11 vel saltem 4° et 5° apice late infuscatis. Long. corporis 9—10 mm.

Kamerun: Jako. — Sammlung VAN ROON und Reichsmuseum in Stockholm.

20. *Plerodia variegata* n. sp. — Nigro-fusca, maculis parvis ferrugineis vel flavescentibus conspersa, his maculis in elytris praesertim pone medium in interstitiis seriatim ordinatis vel in lineas confluentibus; genis longis lobis inferioribus oculorum haud brevioribus; antennis maris corpore parum longioribus, scapo medium pronoti attingente, articulo 3° longo flexuoso articulis 4—8 ad basin, 9—11 fere totis pallidis; prothorace conico, inermi, supra in medio leviter trinodoso, nodo intermedio elongato; scutello magno, apice late rotundato, flavido-hirto, linea media nuda; elytris ad basin sat convexis, apicem versus sensim declivibus et angustatis apice rotundatis et inermibus, a basi ad medium punctis magnis profundis distantibus subseriatis impressis punctis pone medium obsoletis et sensim evanescentibus; pedibus flavescente-piperitis; tarsorum articulo ultimo ad basin flavescente; ventre utrinque ferrugineo-maculato. Long. corporis 11—13 mm.

Peru: Chanchamayo. — Sammlung VAN ROON und Reichsmuseum in Stockholm.

Eine durch die eigentümliche Punktierung der Flügeldecken sehr ausgezeichnete Art.

21. *Alphus biannulatus* n. sp. — Brunneus, infra griseo-pubescens; genis temporibus verticeque inter oculos albidis; fronte, pronoto elytrisque brunneis, fusco-variegatis; fronte paucipunctata; pronoto lateribusque deflexis elytrorum rude et profunde punctatis; antennis brunneis articulis singulis annulis binis fuscis ornatis, scapo in medio albido annulato;

pronato inaequali margine antico in medio tumido dorso tuberculis duobus validis, interdum macula albida ad medium marginis antici ornato; scutello apice truncato et binodoso; elytris ad basin crista quadrinodosa instructis, dorso fere planis et aequalibus vitta latissima suturali lacteo-pubescente a scutello fere ad apicem extensa, mox pone medium leviter constricta et deinde in fasciam transversam margines fere attingentem et maculam brunneam amplectentem dilatata ornatis, apice breviter truncatis; femoribus fusco- et albo-variegatis; tibiis fusco annulatis; tarsis griseo-brunneis. Long. corporis 10—12 mm.

Peru und Bolivia. — Sammlung VAN ROON und Reichsmuseum in Stockholm.

Durch die doppelt geringelten Fühlerglieder und die Zeichnung der Flügeldecken ausgezeichnet.

22. *Pycnomorphus bilineatus* n. sp. — Brunneus, pube albido-griseo subsericea vestitus; lineis duabus dorsalibus, interdum antice abbreviatis pronoti, crista basali elytrorum supra, vitta lata infrahumerali lineisque 3—4 irregularibus pone medium elytrorum nigris aut fuscis; articulis antennarum tibiisque fusco-biannulatis annulis in mare plus minus obsoletis. Long. corporis 12—15 mm.

Venezuela: Merida. — Sammlung VAN ROON und Reichsmuseum in Stockholm.

Die Fühler des ♂ sind bis zur Spitze sehr langhaarig und haben das letzte Glied viel kürzer als das zehnte. Die Art ist mit *pubicornis* nahe verwandt, weicht aber ausser durch die Zeichnung auch durch den langgestreckten Kiel an der Wurzel der Flügeldecken ab.

23. *Acanthoderes latevittata* n. sp. — Brunnea, plaga magna laterali prothoracis tuberculum laterale includente plagaque utrinque metasterni flavido-tomentosis; elytris albido-tomentosis punctis brunneo-areolatis, ad basin granulatis irregulariter conspersis, fascia transversa irregulari pone medium maculaque subapicali nudis brunneis ornatis; corpore infra femoribusque pube cinerascente vestitis; clava femorum tibiisque fuscis, his annulo lato cinereo praeditis; tarsis

nigris articulo ultimo brunneo; fronte lata plana, genis longis, lobis inferioribus oculorum haud brevioribus; antennis feminae apicem elytrorum vix attingentibus, simplicibus, brunneis articulis 3—6 ad basin albido-annulatis; pronoto supra in medio subplano, tuberculo utrinque dorsali minuto vix conspicuo instructo, latissime brunneo, antice et postice punctis paucis impresso, tuberculo laterali magno; scutello obtuso, transverso brunneo; elytris modice convexis omnine aequalibus nec costatis nec tuberculatis, apice recte truncatis inermibus; tibiis anticis apice valde, intermediis et posticis modice dilatatis; prosterno et mesosterno latis, truncatis, utrinque tuberculatis; abdomine impunctato, maculis marginalibus flavidis ornato. Long. corporis 13 mm.

Bolivia. — In der Sammlung von G. VAN ROON.

24. *Lagochirus flavolineatus* n. sp. — Obscure griseo brunneus, elytris linea plus minus lata, ab humeris ad medium suturae ducta et deinde a sutura ad marginem lateralem oblique reflexa et duplicata, ramumque abbreviatum prope suturam retrorsum emittente, maculam magnam lateralem nigro-fuscam cingente ornatis; pronoto utrinque tuberculo valido armato et supra quinque-nodoso, inter tuberculos punctato, flavescente-brunneo, arcu antico lineisque duabus posticis rectis obliquis pone nodos posteriores ornato; scutello obtuso brunneo; elytris latis depressis, apice subrecte truncatis, ante medium profunde punctatis et fasciculis sat longis nigris praeditis, ad basin granulatis, pone medium obsolete punctatis guttisque breviter nigro-setosis conspersis; femoribus flavo- et nigro-variegatis; tarsorum articulis 1° et 2° griseis, 3° et 4° nigris metasterno et abdomine flavo. conspersis, hoc ad basin et in medio denudato brunneo-fusco. Long. corporis 20—25 mm.

♂. Antennarum articulus sextus apice tuberculo piligero instructus.

Columbien. Collectio VAN ROON. — Amazonas, Reichsmuseum in Stockholm.

Weicht durch die dunkelbraune Grundfarbe, die viel grösseren und zahlreicheren Haarpinseln der Flügeldecken so wie durch die Zeichnung recht erheblich von *L. araneiformis* ab.

25. *Trypanidius apicalis* n. sp. — Infra niger, albo- et flavo-conspersus, supra fusco-brunneus; fronte, macula triangula verticis, vitta latissima pronoti, linea undulata curvata ab humeris ad suturam prope medium ducta quartaque parte apicali elytrorum flavescente-albidis, plus minus flavido-maculatis; antennis fuscis articulis 3—11 ad basin flavido-annulatis; femoribus nigris apice flavido-tomentosis, tibiis fuscis ad basin anguste, in medio late flavis; tarsis flavis summo apice fuscis; abdomine maculis lateralibus flavidis ornato; pronoto ad marginem anticum et in sulco basali foveato; elytris a basi ad maculam pallidam apicalem subseriatim granulatis fasciculisque parvis nigris ornatis, bicarinatis carina interiore magis distincta, apice truncatis angulo exteriore leviter dentato (haud spinoso). Long. corporis 16—19 mm.

Bolivia. — Reichsmuseum in Stockholm und G. VAN ROONS Sammlung.

Erinnert an *T. andicola* BLANCH. und *dimidiatus* THOMS., weicht aber sowohl durch die oben angeführten Kennzeichen, unter denen besonders die breite helle Längsbinde des Halsschildes hervorzuheben ist, wie auch durch die vordere Begrenzung des hellen Apicalfleckes der Flügeldecken ab, welche ziemlich quer abgeschnitten ist und nur einige seichte Einbuchtungen hat.

26. *Oberea ceylonica* n. sp. — Fulva, flavo-pubescens; antennis totis, elytris (parte fere tertia basali fulva excepta) segmentisque 2—5 abdominis atris, segmento 2° et 3° interdum in medio pallidis; capite leviter punctato fronte parum convexa; prothorace cylindrico, haud tuberculato sulcis apicali et basali obsoletis, leviter punctato et obsolete transversim strigato; elytris profunde seriato-punctatis parte quarta apicali impunctata, apice oblique truncatis angulo exteriore spinoso; femoribus posticis medium segmenti ventralis secundi haud attingentibus. Long. corporis 16—17 mm.

Ceylon. — Sammlung G. VAN ROON und Reichsmuseum in Stockholm.